

	Igiene	Follow-up	Radiografie	Farmaci	DOMICILIARE ANTISETTICI
<b>Prima della Fase chirurgica</b>	Seduta di igiene pre-trattamento Charting parodontale				CHX 0,20 % due volte die sino a chirurgia
<b>Immediatamente dopo chirurgia</b>	Indicazioni precise su igiene domiciliare, norme comportamento. Impacchi ghiaccio per 15 min alternati per il primo giorno			(Ibuprofen 600 mg. 3 volte die per 2 gg., poi 2 volte die per 2 gg. -- per paz. NO FANS utilizzare Paracetamolo	CHX 0,20% + ac. ialuronico 2 volte /die per 15 gg.
<b>Giorno seguente chirurgia</b>		Richiesta telefonica su stato salute, dolore, etc.			
<b>7 giorni dopo chirurgia</b>		Controllo ferite, edema volto, dolore riferito			
<b>10-12 giorni dopo chirurgia</b>		Rimozione suture e controllo ferita			Continuare CHX 0,20% + ac. ial. per altri 15 gg. se ferita non ottimale
<b>3 mesi dopo chirurgia</b>		Igiene professionale	Verifica clinica e radiografica (TIME ZERO)	Valutare terapia antibiotica sistemica se tasche + 5mm. o presenza pus	Collutorio Oli essenziali senza alcol come routine
<b>6 mesi dopo chirurgia</b>		Igiene professionale			
<b>9 mesi dopo chirurgia</b>		Igiene professionale			
<b>12 mesi dopo chirurgia</b>		Igiene professionale	Verifica clinica e radiografica (TIME ONE)		
<b>18 mesi dopo chirurgia</b>		Igiene professionale			
<b>24 mesi dopo chirurgia</b>		Igiene professionale	Verifica clinica e radiografica (T 2)		